

普陀灵韵

——海岛珍稀物种撷趣

6

鸟类

普陀区共调查记录到鸟类254种,隶属于18目55科145属。

有国家一级重点保护鸟类3种:黄嘴白鹭、黑脸琵鹭、秃鹭,国家二级重点保护鸟类39种:鸳鸯、小鸕鶿、白腰杓鹬、翻石鹬、大风头燕鸥、白琵鹭、栗头鳊、岩鹭等。

列入《中国生物多样性红色名录 脊椎动物卷》中濒危(EN)等级的鸟类有1种:黑脸琵鹭;易危(VU)的鸟类有7种:黄嘴白鹭、林雕、仙八色鸫等。

被列入浙江省重点保护野生动物名录的有36种,包括豆雁、鸳鸯、罗纹鸭、褐翅燕鸥等。



灰雁

雁形目
鸭科
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 无危(LC)

形态特征

头顶和后颈褐色,嘴基有一条窄的白纹,繁殖期间呈锈黄色,有时白纹不明显。上体体羽灰而羽缘白,使上体具扇贝形图纹。胸浅烟褐色,尾上及尾下覆羽均白。飞行中浅色的翼前区与飞羽的暗色成对比。

生境特点 主要栖息在不同生境的淡水水域中,常见出入于富有芦苇和水草的湖泊、水库、河口、水淹平原、湿草原、沼泽和草地。

发现地点 桃花岛。



赤颈鸭

雁形目
鸭科
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 无危(LC)

形态特征

雄鸟特征为头栗色而带皮黄色冠羽。嘴灰色而尖黑色,体羽余部多灰色,两胁 有白斑,腹白色,尾下覆羽黑色。飞行时白色翼羽与深色 飞羽及绿色翼镜成对照。雌鸟嘴灰色而尖黑色,通体棕褐或灰褐色,腹及尾下覆羽白色。飞行时浅灰色的翅覆羽与深色的飞羽成对照。

生境特点 栖息于江河、湖泊、水塘、河口、海湾、沼泽等各类水域中。尤其在富有水生植物的开阔水域中活动。

发现地点 凉潭岛、小干岛、舟山本岛、朱家尖岛、六横岛。

豆雁

雁形目
鸭科
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 无危(LC)

形态特征

头、颈棕褐色,肩、背灰褐色,具淡黄白色羽缘。翅上覆羽和三级飞羽灰褐色;初级覆羽黑褐色,具黄白色羽缘,初级和次级飞羽黑褐色,最外侧几枚飞羽外翮灰色,尾黑褐色,具白色端斑;尾上覆羽白色。喉、胸淡棕褐色,腹污白色,两胁具灰褐色横斑;尾下覆羽白色。嘴甲和嘴基黑色,嘴甲和鼻孔之间有一橙黄色横斑沿嘴的两侧边缘向后延伸至嘴角。脚橙黄色,爪黑色。

生境特点 迁徙期间和冬季主要栖息于开阔平原草地、沼泽、水库、江河、湖泊及沿海海岸和附近农田地区。

发现地点 朱家尖岛。



罗纹鸭


雁形目
鸭科
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 近危(LC)

形态特征

雄鸟嘴黑色,额具小白色斑,头顶栗色,脸侧绿色并后延成冠羽;喉白色具黑色颈环;三级飞羽甚长,向下垂,呈镰刀状;下体满杂以黑白相间波浪状细纹;尾下两侧各有一块三角形乳黄色斑。明显有别于其它鸭类,野外容易鉴别。雌鸭略较雄鸭小,上体黑褐色,嘴和腿暗黑色,两肋略带扇贝形纹,次级飞羽具绿色翼镜且外缘具白色翼带。

生境特点 主要栖息于江河、湖泊、河湾、河口及其沼泽地带,繁殖期尤其喜欢在偏僻而又富有水生植物的中小型湖泊中栖息和繁殖,冬季也出现在农田和沿海沼泽地带。

发现地点 六横岛、朱家尖岛、小干岛、桃花岛、舟山本岛。



鸳鸯

雁形目
鸭科
保护级别 国家二级重点保护野生动物
濒危等级 近危(NT)

形态特征

雌雄异色,雄鸟嘴红色,脚橙黄色,羽色鲜艳而华丽,头具艳丽的冠羽,眼后有宽阔的白色眉纹,翅上有一对栗黄色扇状直立羽,像帆一样立于后背,非常奇特和醒目,野外极易辨认。雌鸟嘴灰褐色,脚橙黄色,头和整个上体灰褐色,眼周白色,其后连一细的白色眉纹,亦极为醒目和独特。胸、肋具点状纵纹。

生境特点 栖息于山地森林河流、湖泊、水塘、芦苇沼泽和稻田地中。

发现地点 舟山本岛、普陀山岛、桃花岛。



赤膀鸭

雁形目
鸭科
保护级别 浙江省重点保护陆生野生动物
濒危等级 无危(LC)

形态特征

雄鸟全身灰色,嘴黑色,头、颈棕色具细小斑点。上体肩羽赤褐色,下体胸具密月牙形斑,尾覆羽黑色。次级飞羽具白斑及腿橘黄为其主要特征。雌鸟似雌绿头鸭但头较扁,嘴侧橘黄色,嘴中灰色;上体暗褐色,羽缘棕色。下体胸、肋具棕色扇贝形羽缘;腹部棕白色。

生境特点 喜欢栖息和活动在江河、湖泊、水库、河湾、水塘、沼泽等内陆水域中。

发现地点 朱家尖岛。



(本版内容来源:《普陀灵韵—海岛珍稀物种撷趣》一书)